

Preparo do exame

TIROSINA PLASMA

INTERPRETAÇÃO

O aumento de tirosina é das alterações neonatais mais comuns. A monitoração laboratorial permite prevenir os possíveis efeitos de desenvolvimento intelectual e/ou motor provocados por altos níveis de tirosina que podem estar associados a aumento secundário da fenilalanina. Indicação: Exame utilizado no diagnóstico da tirosinemia neonatal transitória (TNT) e na monitoração dietoterápica da tirosinemia. Através da monitoração da concentração da tirosina é possível monitorar e ajustar a dietoterapia em crianças, adultos e gestantes com tirosinemia. Interpretação clínica: Em neonatos com TNT nascidos a termo, os níveis séricos geralmente são baixos nos primeiros dois dias após o parto e atingem níveis máximos na segunda semana de vida, podendo ocorrer em até 30% dos prematuros. Pacientes com tirosinemia apresentam níveis elevados de tirosina.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clcando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.