

## Preparo do exame

### TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG (IFI)

#### OUTROS NOMES:

TOXOPLASMA GONDII

#### INTERPRETAÇÃO

Uma vez que a detecção direta de toxoplasma raramente é bem-sucedida, os métodos de detecção serológica desempenham um papel importante no diagnóstico de infecções por *Toxoplasma gondii*. Os anticorpos específicos de classe IgG e IgM são detectáveis em torno de 8 dias após a infecção. Enquanto anticorpos IgM geralmente desaparecem depois de alguns meses, os anticorpos IgG persistem ao longo da vida. Na maioria dos casos a detecção de anticorpos IgG e IgM pode determinar a presença de uma nova infecção, que poderia representar um risco para uma gravidez já existente. Para confirmação, anticorpos IgA específicos e avides de anticorpos IgG específicos são determinados. Uma detecção positiva IgG antes da gravidez é considerada prova de imunidade.

#### INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

#### HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

#### IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirainha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.