

Preparo do exame

TRIPSINA IMUNORREATIVA

OUTROS NOMES

FIBROSE CÍSTICA

INTERPRETAÇÃO

A dosagem de tripsina imunorreativa (IRT) é utilizada especialmente na avaliação do dano pancreático provocado pela fibrose cística. A IRT sobe no sangue devido à obstrução pancreática. Nos casos alterados, o resultado deve ser confirmado por outros testes, como a análise molecular do DNA. Indicação: Marcador específico de dano pancreático, utilizada no diagnóstico de pancreatites. Interpretação clínica: Aumenta na pancreatite aguda após quatro a cinco dias do início da dor abdominal, podendo chegar a níveis de 5 a 10 vezes mais elevados do que o limite superior normal. Ao contrário, na pancreatite crônica os níveis são muito baixos devido à deficiência funcional exógena.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue.

Jejum de 4 horas.

O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame.

Anotar medicamentos dos últimos 7 dias.

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas.

Sábado: das 6:00 às 10:00 horas.

IMPORTANTE

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, RG ou CPF ou CNH.

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de identificação de ambos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.