

Preparo de exames

Biópsia de próstata com sedação

A biópsia de próstata é um procedimento simples e seguro. Realizado com o equipamento de ultrassonografia, a biópsia de próstata é realizada com sedação acompanhada e monitorada por um anestesiolegista.

A biópsia inicia-se com a introdução do aparelho de ultrassom via endorectal, o qual permitirá a localização da glândula prostática. A retirada de fragmentos para análise é feita através de uma agulha específica, que permite a remoção e posterior envio para análise histológica.

Com sedação

No Centro Médico realizamos apenas biópsia com sedação. A sedação leva ao estado de ausência total de dor ou outras sensações durante o procedimento, além de ser monitorado por anestesiolegista. Os riscos e complicações relacionadas à sedação são mínimos. Atualmente a modernidade dos equipamentos e medicamentos utilizados permite uma maior tranquilidade do procedimento.

PREPARO

Caso utilize - Antiagregantes plaquetários como AAS, Agrastat, Aspirina, Bufferin, Cloridrogrel, Iscover, Melhoral, Persantin, Plavix, Reapro, Ticlopidina e Ticlid suspender 7 dias antes do exame. Anticoagulantes como Marevan e Coumadin - suspender 7 dias antes do exame. Anticoagulantes injetáveis como Heparina, Clexane e Fraxiparina – suspender 1 dia antes do exame. Medicamentos para úlcera e gastrite como hidróxido de alumínio ou similares – suspender 2 dias antes do exame. Anti-hipertensivos devem ser mantidos conforme prescrição do paciente. Diabéticos: a medicação deve ser feita somente após a alimentação. Insulina: suspender na noite anterior do exame.

Medicações para o exame

Jejum de 8 horas.

Minilax- administrar via retal 1 hora antes do exame.

Ciprofloxacino - iniciar na noite anterior ao exame e tomar de 12/12 horas. Na manhã do dia do exame, tomar com pequena quantidade de água, pois o paciente estará de jejum. Portanto, antes do exame o paciente deverá tomar 02 comprimidos e o restante após o procedimento.

Orientações após o exame

Manter o Ciprofloxacino 500mg de 12 em 12 horas, durante 7 dias

Caso sinta dores na região anal, poderá utilizar um analgésico de costume, como Lisador, Dipirona ou Paracetamol.

Recomenda-se a ingestão de 2 litros de água por dia para aumentar a frequência urinária.

Após a realização do exame poderá ocorrer presença de sangue na urina e nas fezes, o qual pode perdurar até duas semanas após o procedimento.

No esperma, a presença de sangue poderá ocorrer em até 2 meses.

Não é necessário preocupação, pois isso é normal.

Em caso de febre acima de 38°C nos dois primeiros dias após o exame, entrar em contato imediatamente com o seu médico ou com o Centro Médico através do telefone (15) 99824-8165.

Realizar repouso relativo por 4 dias após o exame.

Ciprofloxacino

Recomenda-se evitar a ingestão de produtos de derivação láctea, sucos de laranjas e cereais, enquanto estiver fazendo o tratamento com o medicamento Ciprofloxacino; essa interação apresenta uma diminuição na eficiência do antimicrobiano.

Ciprofloxacino x Tadalafila

Recomenda-se conversar com o seu médico para um ajuste de dose, pois o Ciprofloxacino pode aumentar os níveis sanguíneos de tadalafila.

Exames

Trazer exames prévios.

Exames de Creatinina e Coagulograma têm validade de 90 (noventa) dias, caso não tenha o Centro Médico oferece este exame gratuitamente ao paciente.

Atividade física

Evitar a prática de exercícios exaustivos por 4 dias, como correr, jogar tênis, musculação, andar a cavalo.

É permitida a prática de exercícios leves, como caminhadas em lugares planos.

Social

Não ter relações sexuais por 4 dias após o exame.

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o uso do antibiótico (Ciprofloxacino).

Atenção: Chegar com 30 minutos de antecedência.

Estar com acompanhante maior de 18 anos.

Não dirigir após o exame.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.