

Preparo de exames

Core biópsia guiada por estereotaxia

Esse exame tem como finalidade a retirada de fragmentos com agulha apropriada, sob anestesia local para análise.

Não utilizar cremes ou óleos na região.

Recomenda-se dieta leve no dia do exame.

Caso utilize - Antiagregantes plaquetários como *AAS, Agrastat, Aspirina, Bufferin, Cloridrogrel, Iscover, Melhoral, Persantin, Plavix, Reapro, Ticlopidina* e *Ticlid* **suspender 10 dias antes do exame.**

Anticoagulantes como *Marevan* e *Coumadin* - **suspender 7 dias antes do exame.** Para pacientes que fazem uso destes medicamentos, deve ser apresentado no dia do exame o resultado de coagulograma ou TP (tempo de protrombina) e TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativa) realizados na véspera.

Anticoagulantes injetáveis como *Heparina, Clexane* e *Fraxiparina* – **suspender 1 dia antes do exame.**

Não é necessário suspender quaisquer outras medicações.

A suspensão dos medicamentos deve ser informada ao seu médico.

CUIDADOS APÓS O PROCEDIMENTO

Não dirigir.

Em caso de sentir muitas dores no local a punção, utilize Tylenol ou Dipirona de 6 em 6 horas.

Atenção: É imprescindível apresentar resultados de exames anteriores, para localização exata do nódulo a ser realizado a biópsia.

Chegar com 30 minutos de antecedência.

Estar com acompanhante maior de 18 anos.

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui.](#)

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.