

Preparo do exame

VITAMINA B2

OUTROS NOMES:

ALCOOLISMO, VITAMINA B2
KWASHIORKOK, VITAMINA B2
PELAGRA, VITAMINA B2
RIBOFLAVINA

INTERPRETAÇÃO

O teste é útil para o diagnóstico de deficiência da vitamina B2, ou riboflavina; Esta condição pode ocorrer em decorrência de alcoolismo, infecções, neoplasias, desnutrição calórico-protéica, gravidez e lactação, e também após cirurgia bariátrica. A deficiência de riboflavina é clinicamente caracterizada por queilite, glossite, dermatite e anemia. Além disso, também está associada a uma maior ocorrência de neuropatias compressivas, como as síndromes do túnel do carpo ou do túnel do tarso.

INSTRUÇÃO DE COLETA

Material: Sangue

Jejum de 8 horas

O cliente não deve ingerir vitaminas nas últimas 48 horas antes do exame.

Bebidas alcoólicas também não podem ser consumidas nas últimas 24 horas.

Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s)

HORÁRIO DE COLETA

Segunda a Sexta: das 6:00 às 11:00 horas

Sábados: das 6:00 às 10:00 horas

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico [clikando aqui](#).

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.